

Pour traiter votre diabète et améliorer vos glycémies, votre médecin vient de vous prescrire un médicament de la famille **des ANALOGUES DU GLP1 :**

Le **BYETTA**,

À la posologie de .....microgramme par jour

### ***Comment agit votre médicament ?***

Il stimule la sécrétion d'insuline stockée dans votre pancréas, en réponse à l'augmentation de la glycémie (l'insuline est l'hormone qui fait baisser la glycémie).

Il bloque la sécrétion d'une autre hormone (le glucagon) qui fait augmenter le taux de sucre dans le sang.

Dans certains cas, il peut diminuer la sensation de faim et entraîner une perte de poids.

### ***Quand faire l'injection ?***

Pour une bonne tolérance, 20 à 25 minutes (maximum 1 heure) avant le petit déjeuner ou le dîner, selon la prescription. Elle ne doit pas être faite après un repas.

Les injections doivent être séparées d'au moins 6 heures.

Si vous oubliez une injection, faites simplement la suivante à l'heure habituelle (pas de double dose).

### ***Quel délai entre le début du traitement et l'effet sur vos glycémies ?***

Les glycémies peuvent s'améliorer dès les premiers jours de traitement.

Le traitement sera revu et pourra être adapté en fonction des résultats : carnet des glycémies quotidiennes et hémoglobine glyquée = HbA1C.

### ***Comment conserver votre médicament ?***

Les stylos se conservent au réfrigérateur (2-8°C).

Le stylo en cours d'utilisation peut être conservé 1 mois à température ambiante, à l'abri de la lumière, puis doit être jeté.

### ***Conseils généraux pour réaliser l'injection***

Lavez-vous les mains avant l'utilisation. Utilisez une nouvelle aiguille à chaque injection.

### ***Quels sont les principaux effets indésirables possibles ?***

Il est possible que vous ressentiez des troubles digestifs passagers en début de traitement :

- Nausées ou vomissements
- Diarrhée

La fréquence et l'intensité des nausées diminuent au cours du traitement

S'il est associé à des sulfamides, ce médicament peut provoquer des hypoglycémies.

### ***Quelques précautions à prendre :***

Avant de prendre un autre médicament de vous-même, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Vous devez toujours signaler votre diabète et votre traitement à tous les professionnels de santé.

### **!!! A retenir !!!**

- Pas d'injection après un repas
- Au moins 6h entre 2 injections
- Troubles digestifs possibles en début de traitement, qui vont disparaître avec le temps.