



Pour traiter votre diabète et améliorer vos glycémies, votre médecin vient de vous prescrire

un médicament de la famille **des INHIBITEURS DES ALPHA GLUCOSIDASES**

Le .....

À la posologie de ....comprimé(s), .... Fois par jour

### ***Comment agit votre médicament ?***

Il ralentit l'absorption des sucres dans l'intestin et aide donc à améliorer les glycémies après les repas.

### ***Quand prendre votre médicament ?***

En début du repas.

La posologie prescrite doit être atteinte progressivement pour éviter les effets indésirables.

Par exemple, on commence à 1 comprimé par jour pendant quelques jours, puis on passe à 2 comprimés par jour puis à 3.

Si vous oubliez de prendre votre médicament, ne doublez pas la dose à la prise suivante.

### ***Quel délai entre le début du traitement et l'effet sur vos glycémies ?***

Les glycémies après les repas peuvent s'améliorer dans les semaines qui suivent le début du traitement.

Le traitement sera revu et pourra être adapté en fonction de vos résultats : carnet des glycémies quotidiennes et hémoglobine glyquée = HbA1C.

### ***Quels sont les effets indésirables possibles ?***

En début de traitement, des troubles digestifs sont possibles :

- Météorisme
- Flatulences
- Douleurs abdominales modérées
- Diarrhée

La majoration progressive de la posologie limite ces effets secondaires.

**Ce médicament ne provoque pas d'hypoglycémie**

### ***Quelques précautions à prendre :***

Avant de prendre un autre médicament de vous-même, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Vous devez toujours signaler votre diabète et votre traitement à tous les professionnels de santé.

### **!!! A retenir !!!**

- Je prends mes comprimés au début du repas
- Au début du traitement, la posologie est progressive.
- Je peux ressentir des troubles digestifs en début de traitement. Si ces troubles persistent, j'en parle avec mon médecin