

Tableau des différentes insulines

dernière mise à jour 23/02/2017

www.diamip.org

1/2
















































Insulines	Nom commercial	Flacon	Cartouche	Stylo jetable 3ml	Action des insulines*		Spécificités
	Laboratoire	100 U/ml	100 U/ml 3ml		délai	Durée	
Analogues d'insuline rapide : action très rapide 	NovoRapid® NOVONORDISK			NovoRapid FlexPen 100 U/ml 	5 mn	+/- 3h	Injection à faire au moment du repas compatible avec les pompes portables
	Humalog® LILLY			Humalog KwikPen 100 U/ml 			
	Humalog® LILLY			Humalog KwikPen 200 U/ml 			
	Apidra® SANOFI AVENTIS		ClikSTAR JuniorSTAR 	Apidra SoloSTAR 100 U/ml 	5 mn	+/- 3h	
Insulines d'action rapide 	Umuline® Rapide LILLY				20 à 30 mn	4h à 6h	Injection à faire 20 à 30 mn avant le repas
	Actrapid® NOVONORDISK		Actrapid Penfill® 				
Insulines d'action intermédiaire 	Insulatard® NOVONORDISK			Insulatard NPH InnoLet 100 U/ml  Insulatard FlexPen 100 U/ml 	1h	10h à 12h	Injection soit au moment du repas soit indépendante des repas Insuline laiteuse : bien agiter avant injection
	Umuline® NPH LILLY			NPH Pen 100 U/ml 			
Analogues d'insuline d'action lente	Levemir® NOVONORDISK			Levemir InnoLet 100 U/ml  Levemir FlexPen 100 U/ml 	1h30	Action > à 14h et jusqu'à 24h selon dose d'insuline et type de diabète  Ne pas mettre en contact avec autres insulines	
Analogues d'insuline d'action lente 	Lantus® SANOFI AVENTIS		ClikSTAR JuniorSTAR 	Lantus SoloSTAR 100 U/ml 	1h30	Jusqu' à 24h	Injection indépendante des repas mais à heure régulière  Ne pas mettre en contact avec d'autres insulines
	Toujéo® SANOFI AVENTIS			Toujéo SoloSTAR 	1h30	Jusqu' à 36h	
	Abasaglar® LILLY		Humapen Savvio Humapen Luxura HD	Abasaglar Kwikpen 100 U/ml 	1h30	Jusqu' à 24h	

Tableau des différentes insulines

dernière mise à jour 23/02/2017

www.diamip.org

2/2

Insulines	Nom commercial Laboratoire	Flacon 100 U/ml	Cartouche 100 U/ml 3ml	Stylo jetable 100 U/ml 3ml	Action des insulines * dans la majorité des cas		Spécificités
					délai	Durée	
Il existe des mélanges préétablis de certaines des insulines ci dessus Le chiffre indiqué représente le pourcentage d'insuline rapide							
Analogues d'insuline rapide + Insuline de durée d'action intermédiaire 	Novomix® 30			FlexPen 	5 mn	jusqu'à 10 à 12h	Injection au moment des repas. Agiter l'insuline avant l'injection
	Novomix® 50 Novomix® 70 NOVONORDISK						
	Humalog® Mix 25 Mix 50 LILLY		 	Humalog Mix25 Pen et KwikPen  Humalog Mix50 Pen et KwikPen 			
Insuline rapide + Insuline de durée d'action intermédiaire 	Mixtard® 30 NOVONORDISK				20mn	Jusqu'à 10 à 12h	Injection 20 à 30 mn avant le repas. Agiter l'insuline avant l'injection
	Umuline® Profil 30 LILLY			Umuline Profil 30 PEN 			

* Délai et durée d'action des insulines selon l'avis des soignants rédacteurs de ce tableau et dans la majorité des cas des patients.

En savoir plus

Laboratoires	N° Vert 7j/7 24h/24
SANOFI AVENTIS	0800 10 52 53
LILLY	0800 00 36 36
NOVONORDISK	0800 80 30 70 * * sauf jours fériés